

Gestion des invasifs

Certaines essences introduites sont des plantes invasives et peuvent déséquilibrer la biodiversité des boisements. Il est important de savoir les identifier pour pouvoir les éliminer.

Vous trouverez ci-dessous, une liste non exhaustive de plantes invasives repérées à Caluire et Cuire, ou qui seraient susceptibles d'être présentes.

Pour plus d'information sur la législation, le référencement de toutes les espèces invasives sur le territoire et des liens utiles :

www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/especes-exotiques-envahissantes

Ailante « *Ailanthus altissima* »

Reconnaissance:

Plante ligneuse*. Feuille caduque composée imparipenné* de 30 à 90cm de long, vert tendre, odorante, pétiole* légèrement rougeâtre. Fructification en samare (graine sur ailette comme l'érable). Écorce lisse, grisâtre, lenticelle* sur les jeunes bois, bois clair avec une odeur d'arachide.

Comportement:

Cette essence est très performante dans tous les types de sols, même les plus stériles. Elle a une reproduction sexuée avec une dissémination de graine massive et asexuée avec l'apparition de drageon aux alentours du pied.

Lutte:

Suppression des drageons*, par arrachage si possible, et abattage des grands sujets en été, période la moins propice à l'apparition de rejets et de drageons. Suivi intensif jusqu'à la disparition total des rejets* et drageons.

* Voir Glossaire



Détail de l'Ailante, de gauche à droite : feuille, tige et graines. Source : Ville.

Renouée du Japon « Reynoutria japonica »

Reconnaissance:

Plante herbacée. Tige caduque creuse de couleur vert clair tachetée de rouge, portant des feuilles légèrement cordiforme. Floraison blanche fine en panicule*.

Comportement:

Cette essence est une plante rhizomateuse*, 2/3 de son appareil végétatif est dans le sol sous forme de rhizome, lui permettant de coloniser des espaces très rapidement. Sa floraison en fin d'été est abondante, laissant un grand nombre de graines. Chaque partie de la plante a un fort potentiel à se bouturer si elle est en contact avec le sol.

Lutte:

La méthode la plus efficace est l'excavation sur 1m de profondeur et l'évacuation de la terre en plateforme spécialisée. Sinon: suppression des tiges tout au long de l'année, même les plus petites pour épuiser la plante. Évacuation en déchetterie une fois la tige complètement séchée. Bâchage de la zone possible avec un matériau opaque. Mise en concurrence par des plantes arbustives robustes (saule, noisetier). Attention : Ne surtout pas composter cette plante, le risque de bouturage est trop important.

* Voir Glossaire



Détail de la Renouée, de gauche à droite : partie végétative, feuille et tige. Source: Ville.



Détail de la Renouée, en fleur: source interne

Arbre aux papillons « Buddleja davidii »

Reconnaissance:

Plante arbustive. Feuille caduque duveteuse légèrement grise sur le revers. Tiges anguleuses gris-vert quand elles sont jeunes, puis ocre, lacérées légèrement liégeuses quand elles vieillissent. Floraison en panicule*.

* Voir Glossaire

Comportement:

Cette essence arbustive est moins présente en milieu forestier mais il est possible de la retrouver ponctuellement en bordure de forêt. Elle possède un système racinaire très performant, ce qui lui permet de se plaire sur tout les terrains, même dans les murets. La dissémination se fait principalement via ses graines.

Lutte:

Suppression des rejets et tiges en été, par arrachage si possible, période la moins propice à l'apparition de rejets et de drageons*. Suivi intensif jusqu'à la disparition total des rejets et drageons*.



Détail de l'Arbre aux papillons, de gauche à droite: port, tige, feuille et fructification. Source : Ville.



L'arbre aux papillons en fleur. Source : Internet

* Voir Glossaire

Laurier cerise « *Prunus laurocerasus* »

Reconnaissance:

Plante arbustive. Feuille persistante coriace et brillante. Tiges vert tendre quand elles sont jeunes, puis brun gris quand elles vieillissent. Floraison en panicule* blanche, baie allant du vert, puis rouge et enfin noire une fois mature.

Comportement:

Cette essence arbustive est très connue pour avoir été longtemps utilisée pour les haies, elle affectionne les endroits peu lumineux et s'adapte donc extrêmement bien dans les sous-bois.

Lutte:

Suppression des rejets, par arrachage si possible, et abattage des grands sujets en été, période la moins propice à l'apparition de rejets et de drageons. Suivi intensif jusqu'à la disparition totale des rejets et drageons*.



Détail du Laurier cerise, de gauche à droite : partie végétative, feuilles. Source : Ville.



De gauche à droite : Fructification et floraison. Source : Internet.

* Voir Glossaire

Pour plus d'information sur la législation, le référencement de toutes les espèces invasives sur le territoire et des liens utiles :

www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/especes-exotiques-envahissantes